今年 インフルエンザから身を守るために

今年のインフルエンザは、例年よりも早い時期から患者報告が始まっており、すでに一部地域では学級閉鎖などの影響も出ています。特にインフルエンザや新型コロナは、重症化や周囲への感染リスクもあるため、日頃の予防が重要です。

< 風邪・インフルエンザ・コロナの違い >

比較項目	風邪	インフルエンザ	新型コロナ
感染経路	飛沫・接触	飛沫・接触	飛沫・接触 エアロゾル
発症の速さ	徐々に	急激に（高熱）	ゆるやか～急激 （個人差あり）
主な症状	のどの痛み、鼻水、くしゃみ	高熱、関節痛、倦怠感	発熱、倦怠感、咳、味覚・嗅覚異常
発熱の程度	微熱（37～38℃）	高熱（38℃以上）	微熱～高熱 （個人差あり）
重症化リスク	低い	高齢者・持病ありの方 可能性あり	可能性あり
感染力	比較的弱い	強い	非常に強い

< 感染予防の基本 >

1. 手洗い・手指消毒

タイミング：外出後、食事前、トイレ後、咳やくしゃみの後
方法：石けんと流水で20秒以上洗う

指の間・爪の間・手首までしっかり洗う
アルコール消毒液を使う場合は、乾くまでこすり続ける

2. マスクの正しい着用

鼻からあごまでしっかり覆う
隙間がないようフィットさせる
使い捨てマスクは1日1枚、汚れたらすぐ交換

3. 咳エチケット

咳やくしゃみはティッシュ・ハンカチ・袖で口を覆う
手で直接受け止めない
使用したティッシュはすぐに捨て、手洗いを忘れずに

4. 換気と加湿

1時間に1回以上の換気（5～10分程度）
室内湿度は50～60%が理想（乾燥するとウイルスが活性化）

5. 体調管理と免疫力アップ

十分な睡眠（7～8時間）
バランスの良い食事（ビタミン・タンパク質）
適度な運動（週3回以上の軽い運動）
こまめな水分補給

6. 接触感染の予防

ドアノブ・スイッチ・スマホなどの定期的な消毒
共有物（タオル・食器など）は避けるか、こまめに洗浄

インフルエンザ予防接種も感染予防に非常に有効です。発症のリスクを減らし、重症化を防ぐ効果があります。しかし、接種後約2週間経過しないと効果が発揮されず、約5か月間効果が持続しますので、10～11月中旬の接種がベストタイミングとされています。

< インフルエンザに感染したら >

① まずは安静に

発熱・倦怠感・関節痛などの症状が出たらすぐに休養
無理に出勤・登校せず、自宅で静養することが最優先

② 医療機関を受診するタイミング

発症後6～48時間以内が抗ウイルス薬の効果が高いタイミング
発熱直後は検査が陰性になることもあるため、6時間以上経過後の受診が推奨

③ 水分・栄養補給

高熱により脱水しやすいため、こまめな水分補給が重要
経口補水液やイオン飲料、ゼリー・お粥など消化に良いものを少量ずつ摂取

④ 外出・出勤は控える

発症後5日＋解熱後2日間はウイルス排出の可能性があるため、外出はNG
他人にうつさないためにも、マスク着用・手洗いの徹底を忘れずに

⑤ 家族内感染の予防

共有物（タオル・食器など）を避ける
患者と同室を避けるか、マスク・手袋を使用
ドアノブ・スイッチなどの消毒をこまめに

栃木県農協健保では、当健保加入者を対象にインフルエンザ予防接種料の補助を実施しております。詳細は「健保だより 157秋号」をご参照ください。